

การป้องกัน

สัมผัสรับประสาชนหน้าบุ้ง


- ควรป้องกันไม่ให้บุ้งกัด ด้วยการสวมเสื้อผ้าให้มีสีดีด
และไม่มีสีเด่นทางการบันยง กรณีเดินทางพำนัชญุงลง
กำจัดบุ้งในและบุ้งภายนอกตัวเร็วๆ
- หากป่วยภูมิแพ้ยาอาจรีบ ออกผื่น เสื่อมคล้ำกันเสเม ปวดหัว
ชักนิ่งเล็ก ปวดตื้นร่องคุณแม่เจ้าไปหมดทั้งๆ พ้อรมแมลง
ปะระดัดเดินทาง (ร้าม)
- สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปเดินทางไปประเทศที่มี
การระบาด ห้ามมีความลามเป็นทั้งตัวเดินทาง ควบคุมเข้า
ประเทศและป้องกันไม่ให้บุ้งกัด

การตรวจหา

ไวรัส Zika Virus

ทำได้โดยการตรวจหาสารพัษภูมิคุ้มครองด้วยวิธี
Polymerase Chain Reaction (PCR)
และภาระแยกให้ไว้ตั้งจากตัวอย่างเสื้อตัว
และปัสสาวะ ของผู้ป่วย

- หน่วยงานสาธารณสุขทำการบริการและประเมินการผ่านรัฐวิจัย
เพื่อป้องกันคนดูแลไม่ติดเชื้อไวรัสซิก้า โดยมีระยะเวลา
เพื่อรักษา 4 ตัวน ให้ได้ การผ่านรัฐวิจัยจะประเมินตัววิจัย
การผ่านรัฐวิจัยทางนี้วิทยา การผ่านรัฐวิจัยทางราษฎร์ติด
ที่นี่ภาระพิการแต่กำเนิด แต่การผ่านรัฐวิจัยทางนี้จะสามารถ
ทางระบบประสาท แหล่งต้นภัยโรคติดเชื้อความพิรุณ
ภาระและลักษณะ และการดำเนินการควบคุมภัยพิบัติได้



สถาบันวิจัยด้านการแพทย์และพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0 2590 3159
สังกัดงานควบคุมโรค 1422
<http://beid.ddc.moph.go.th>

