


โรคติดต่อ ไวรัสซิกา

เชื้อไวรัสซิกาคืออะไร เชื้อไวรัสซิกา Zika Virus Disease อยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus) จำพวกเดียวกับไวรัสไข้เหลือง ไวรัสแดงที่ (โรคไข้เลือดออก) ไวรัสเวสต์ไนล์ (โรคไข้เวสต์ไนล์) และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี มีขลุ่ยลายเป็นพาหะนำโรค มีรายงานพบการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา Zika Virus Disease ในพื้นที่ของทวีปแอฟริกา เอเชีย หมู่เกาะแปซิฟิก และอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบอเมริกาใต้และแคริบเบียน และมีแนวโน้มการระบาดของโรคจะแพร่กระจายไปยังประเทศใหม่ๆ เนื่องจากการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ยังขลุ่ยลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคยังมีกระจายอยู่ในหลายทวีปทั่วโลกผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ 80% ไม่มีอาการ



อาการ

ระยะฟักตัวของโรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา Zika Virus Disease ตั้งแต่รับเชื้อกระทั่งแสดงอาการใช้เวลาประมาณ 3-12 วัน (เฉลี่ย 4-7 วัน) อาการที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้ ออกผื่น เยื่อบุตาอักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ อาการเหล่านี้ปกติแล้วจะเป็นเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง อาการเหล่านี้ทุเลาลงภายใน 2-7 วัน ได้เอง ยกเว้นในหญิงตั้งครรภ์ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะศีรษะเล็กแต่กำเนิด (Microcephaly) ในทารกแรกเกิด หรือผู้มีภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท



สามารถติดต่อเชื้อไวรัสซิกา

Zika Virus Disease ได้จากไหนบ้าง

เชื้อไวรัสซิกา Zika Virus Disease สามารถติดต่อได้ทางช่องทางหลัก โดยการถูกขลุ่ยลายที่มีเชื้อไวรัสซิกา Zika Virus Disease กัด ส่วนช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเป็นไปได้คือการแพร่ผ่านทางเลือด เช่น การถ่ายเลือด หรือจากแม่ที่ป่วยเป็นโรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกาสู่ทารกในครรภ์ ส่วนการแพร่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์นั้นยังมีรายงานเป็นจำนวนน้อย จึงควรป้องกันการถูกขลุ่ยลายกัดเป็นหลัก

